高效液相色谱法测定青霉素V钾片中主药的含量

金建平* (安徽芜湖市药品检验所, 芜湖市 241000)

中图分类号 R927.2 文献标识码 A 文章编号 1001-0408(2005)17-1338-02

摘要 目的: 建立以高效液相色谱法测定青霉素V钾片中主药含量的方法。方法: 色谱柱为 Diamonsil C₁₈, 流动相为乙腈-0.02mol/L 醋酸钠(70:30), 流速为 1.0 ml/min, 检测波长为 268nm, 灵敏度为 0.01AUFS, 柱温为(26±1)℃, 进样量为 20μl。结果: 青霉素V钾检测浓度在 10.0~120.0μg/ml 范围内与峰面积呈良好的线性关系($r=0.999$, $n=5$); 平均加样回收率为 100.2%(RSD=0.42%)。结论: 本方法快速、简便、准确, 可用于青霉素V钾片的质量控制。
关键词 高效液相色谱法; 青霉素V钾; 含量

Content Determination of the Principal Agent in Phenoxymethylpenicillin Potassium Tablets by HPLC JIN Jianping(Anhui Wuhu Institute of Drug Control, Wuhu 241000, China)

ABSTRACT OBJECTIVE: To establish HPLC method for the determination of the principal agent in phenoxymethylpenicillin potassium tablets. METHODS: The determination was performed on Diamonsil C₁₈ column with column temperature at (26±1)℃. The mobile phase consisted of acetonitrile-0.02mol/L sodium acetate(70:30) with a flow rate at 1.0ml/min. The detection wavelength was set at 268nm; the sensitivity was 0.01AUFS and the sample size was 20μl. RESULTS: Good linear correlation with peak area was noted when the detection concentration range was 10.0~120.0μg/ml for phenoxymethylpenicillin potassium($r=0.999$, $n=5$). The average recovery was 100.2% (RSD=0.42%). CONCLUSION: The method was rapid, simple and accurate and it can be used to determine the content of the principal agent in phenoxymethylpenicillin potassium tablets.

KEY WORDS HPLC; Phenoxymethylpenicillin potassium; Content

青霉素V钾系青霉素V(即苯甲氧基青霉素)的钾盐,为口服易吸收青霉素类抗生素,其抗菌谱与青霉素相同,对多数革兰阳性菌、革兰阴性球菌及个别革兰阴性杆菌(如嗜血杆菌属)、螺旋体和放线菌均有抗菌活性,具有疗效好、不良反应发生率低的优点。2000年版《中国药典》(二部)^[1]中对青霉素V钾片的含量测定采用的是咪唑催化-汞盐形成的分光光度法,而其原料用的是以铂电极作为指示电极、汞-硫酸亚汞电极为参比电极的电位滴定法。另有文献报道^[2],这两种方法测得的含量均偏高,原因是受青霉素V钾中诸多杂质的干扰等。现笔者建立的高效液相色谱(HPLC)法测定青霉素V钾片主药含量的方法,不仅能有效排除干扰,而且方法快速、简便、准确,可用于青霉素V钾片的质量控制。

1 仪器与试剂

1.1 仪器

LC-6A 高效液相色谱仪,包括 SPD-10A 紫外检测器(日本岛津公司);N2000 色谱工作站(浙江大学)。

1.2 试剂

青霉素V钾对照品(中国药品生物制品检定所,含量:99.5%,批号:130490-200102);青霉素V钾片(华北制药股份有限公司,批号:0209104、0308206;昆明积大制药有限公司,批号:030902;长春今来药业集团有限公司,批号:20040101、20040301、20040601);乙腈为色谱纯,醋酸钠为分析纯。

2 方法与结果

2.1 色谱条件

色谱柱: Diamonsil C₁₈(150mm×4.6mm, 5μm);流动相:乙腈-0.02mol/L 醋酸钠(70:30);流速:1.0ml/min;检测波长:268nm;灵敏度:0.01AUFS;柱温:(26±1)℃;进样量:

* 副主任药师。研究方向: 抗生素药品检验。电话: 0553-5852117。E-mail: jjp1002@yahoo.com.cn

20μl。理论塔板数按峰青霉素V计算应大于2500。

2.2 对照品溶液的制备

取青霉素V钾对照品约25mg,准确称定,置于25ml容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀。精密量取该溶液10ml,置于100ml容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即得。

2.3 供试品溶液的制备

取青霉素V钾片10片,准确称定,研细,混合均匀,准确称取适量(约相当于青霉素V钾25mg),置于50ml容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,过滤。精密量取续滤液10ml,置于50ml容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即得。

2.4 线性关系考察

准确称取青霉素V钾对照品50mg,置于10ml容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,配成含青霉素V钾浓度为5mg/ml的溶液作为贮备液。分别精密吸取该贮备液0.2、0.4、0.8、1.2、1.6、2.4ml,各置于100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,即得系列对照品溶液。分别按“2.1”项下色谱条件精密吸取各溶液20μl进样测定,记录峰面积,色谱详见图1。以浓度(C)对峰面积(A)进行回归,得回归方程为 $C=1.4866 \times 10^{-4}A+0.2106$ ($r=0.999$, $n=5$)。结果表明,青霉素V钾检测浓度在10.0~120.0μg/ml时,峰面积与浓度呈良好的线性关系。

2.5 精密度试验

分别精密吸取“2.4”项下浓度分别为20.0、50.0、100.0μg/ml的青霉素V钾对照品溶液进行3h和8h精密度试验。结果,在“2.1”项下色谱条件下连续进样6次,记录峰面积积分值,得峰面积积分值的相对标准差均小于1.0%,表明青霉素V钾溶液进样精密度良好。

2.6 重现性试验

分别准确称取青霉素V钾对照品约10mg,置于100ml容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度。按“2.2”项下方法配制6份,

丹参的化学成分及其制剂的指纹图谱与质量标准研究进展*

曹冬[#], 黄喜茹[△], 王建华, 刘伟娜, 侯海妮(河北医科大学药学院, 石家庄市 050017)

中图分类号 R282.5 文献标识码 A 文章编号 1001-0408(2005)17-1339-03

丹参为唇形科植物丹参 (*Salvia miltiorrhiza* Bge) 的干燥根及根茎, 主要产于四川、山西、河北、江苏、安徽等省。其始载于《神龙本草经》, 被列为上品。中医理论认为, 丹参性味苦, 微寒, 归心、肝经, 具有祛瘀止痛、活血通经、清心除烦之功效。丹参及其制剂对治疗心、脑血管疾病, 癌症、中风、肝炎等疾病及抗衰老均有良好的效果^[1]。近年来, 国内、外学者对丹参的化学成分、药效学、药理学、药动学等方面进行了大量研究。本文拟对丹参的化学成分及其制剂的指纹图谱与质量标准研究等方

面的进展作一综述, 以为其深入研究提供参考。

1 化学成分

丹参的化学成分主要分为 2 类: 脂溶性二萜醌类和水溶性酚酸类^[2]。

1.1 丹参脂溶性成分

丹参脂溶性成分是丹参的主要有效成分, 且含量较高, 有较强的生理活性, 该类化合物主要有: 丹参酮 I、丹参酮 II_A、丹参酮 II_B、隐丹参酮、丹参酸甲酯、丹参新酮、二氢丹参酮 I、次

图 1 高效液相色谱

1. 青霉素 V 钾

Fig 1 HPLC

1. phenoxymethylpenicillin potassium

并按“2.1”项下色谱条件进样测定, 结果 RSD = 0.93%。

2.7 稳定性试验

取“2.6”项下青霉素 V 钾溶液, 分别于室温下放置 0、2、4、6、8、10h 后按“2.1”项下色谱条件进样, 结果发现在 8h 后, 主峰面积趋于下降, 而杂质峰增多。表明青霉素 V 溶液在 8h 内稳定。

2.8 回收率试验

取已知含量的片剂(批号: 0209104) 细粉适量(约相当于青霉素 V 钾 12mg), 置于 50ml 容量瓶中, 共 3 份, 分别准确加入一定量青霉素 V 钾对照品, 按“2.3”项下方法操作, 配成约相当于样品测定浓度 80%、100%、120% 的溶液, 各按“2.1”项下色谱条件进样 20μl 测定, 记录峰面积, 结果详见表 1。

表 1 回收率试验结果

Tab 1 Results of recovery test

样品量(mg)	加入量(mg)	测得量(mg)	回收率(%)	$\bar{x}$	RSD(%)
12.24	10.09	22.31	100.3		
12.11	13.26	25.49	99.8	100.2	0.42
12.16	18.51	30.64	100.6		

* 河北省卫生厅资助项目(04102)

硕士研究生。研究方向: 药物分析研究。电话: 0311-6265623。

△ 通讯作者: 教授, 硕士生导师。研究方向: 中西药物分析研究。电话: 0311-6265623。E-mail: huangxr@hebm.u.edu.cn

2.9 样品含量测定

取“2.2”、“2.3”项下溶液各 20μl, 按“2.1”项下色谱条件进样测定, 记录色谱峰面积。按外标法计算供试品中青霉素 V 钾的含量, 并与咪唑催化-汞盐形成的分光光度法(简称咪唑法)比较, 结果详见表 2。

表 2 样品含量测定结果

Tab 2 Content determination results of samples

厂家	批号	HPLC法(标示量, %)	咪唑法(标示量, %)
华北	0209104	97.5	100.8
华北	0308206	98.2	103.6
积大	030902	100.6	104.0
今来	20040101	97.3	100.5
今来	20040301	97.9	103.5
今来	20040601	98.0	104.9

3 讨论

2000 年版《中国药典》(二部) 记载的青霉素 V 钾片的含量测定方法中, 所用的咪唑溶液配制较为繁琐且不稳定, 在放置数日后, 其紫外吸收度往往超过 0.05。

青霉素 V 钾中有诸多杂质存在, 如合成中的副产物对羟基青霉素 V、放置过程中的降解产物青霉素 V 噻唑酸等。在电位滴定法和咪唑法中都很难排除这些物质的干扰, 往往有含量偏高造成结果误差大的现象。运用 HPLC 法对青霉素 V 钾进行含量测定时, 不但操作简便, 同时还能排除以上所述干扰因素, 结果更为准确可靠, 可用于青霉素 V 钾片的质量控制。

取青霉素 V 钾对照品适量, 加水溶解并稀释成约浓度为 100μg/ml 的溶液, 于 200nm~400nm 波长范围内扫描, 结果在 268nm 及 274nm 有最大吸收, 故选择 268nm 检测可提高检测灵敏度。

参考文献

- [1] 国家药典委员会编. 中华人民共和国药典(二部) [S]. 2000 年版. 北京: 化学工业出版社, 2000: 353, 354.
- [2] 胡昌勤. 高效液相色谱法在抗生素质控分析中的应用(下册) [M]. 北京: 气象出版社, 2001: 4.

(收稿日期: 2004-10-17 修回日期: 2005-03-04)